




Hemangioendoteliom jater

Je řídkým onemocněním. Manifestuje se většinou bolestí při prorůstáním nádoru mimo játra. Indikovány jsou především nádory nevhodné k chirurgické léčbě pro svou velikost. Prognóza je dobrá, i v případě extrahepatálních metastáz je dlouhodobé přežívání časté. ⁽⁹⁹⁾

Hepatoblastom

Je vzácný nádor dětského věku, který je zvažován k transplantační léčbě v případech, kdy i po chemoterapii svým rozsahem přesahuje možnosti radikální resekce. Výsledky bývají příznivé i v případě angioinvasí a vzdálených metastáz. ^(100, 101)

Metastatické nádory

Nejsou indikací k transplantaci jater s výjimkou dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů trávicího traktu a slinivky. I zde má radikální resekční či onkologická léčba přednost. Recidiva a progresse onemocnění je častá. Jedná se o hraniční indikaci s nejistým výsledkem. ⁽¹⁰²⁾

Nezhoubné nádory

Adenom jater a hemangiom

Jsou indikovány jen v takových případech, kdy jsou symptomatické (krvácení do dutiny břišní, vzácně mechanický syndrom) a není možno je bezpečně resekovat. Jedná se o velmi vzácnou indikaci. ⁽¹⁰³⁾

Polycystóza jater

Většinou nevede k jaterní insuficienci. Transplantace jater je indikována u pacientů s enormní hepatomegalií při klinicky nepochybném mechanickém syndromu nebo v případech, kdy dojde k většinou neřešitelné infekci některé z cyst. Výsledky transplantace jater jsou u těchto nemocných komplikovány renální nedostatečností a recidivujícími septickými komplikacemi. ^(104, 105)

