

Indikace k transplantaci jater

Doporučený postup



:souhrn:

Transplantace jater je život zachraňující výkon, pro zlepšení kvality života se provádí výjimečně. Hlavní indikací je selhání jater při akutním či chronickém jaterním onemocnění, metabolické vady vázané na játra a některé nádory jater. Transplantace jater je indikována tehdy, převýší-li riziko úmrtí při konzervativní léčbě riziko transplantace. Tomu odpovídá pacient s chronickým selháním na rozhraní funkční třídy Child-Pugh B/C nebo při MELD skóre 15 - 17 bodů. Přítomnost spontánní bakteriální peritonitidy, refrakterního ascitu či hepatorenálního syndromu, významné jaterní encefalopatie a recidivující krvácení při portální hypertenzi jsou významné známky potřeby transplantační terapie. K doporučení do transplantačního centra musí dojít s dostatečným předstihem.



K transplantaci jater při akutním selhání jsou indikováni pacienti s vysokou pravděpodobností letálního průběhu onemocnění. Londýnská kritéria jsou standardním nástrojem odhadu letální prognózy, někteří pacienti však zemřou, aniž by tato kritéria byla splněna. Transplantační centrum je třeba kontaktovat bezprostředně po stanovení diagnózy.

Hlavní kontraindikací transplantace je vysoké riziko neúspěchu z důvodu přílišné pokročilosti selhání nebo přidružených onemocnění jiných životně důležitých orgánů. Jasnou kontraindikací tvoří nekorigovatelná onemocnění životně důležitých orgánů, mimojaterní maligní onemocnění, závislost na návykových látkách a neschopnost či neochota ke spolupráci.

