



:kontraindikace transplantace jater:

Jako život zachraňující metoda má transplantace jater jen málo absolutních kontraindikací. Hlavním důvodem odmítnutí je malá naděje na úspěch ať z důvodu pokročilosti jaterního selhání nebo pro existenci závažného extrahepatálního, transplantací jater nekorigovatelného onemocnění, které limituje přežití nemocného. Do této skupiny patří především těžká kardiopulmonální onemocnění a generalizovaná nádorová onemocnění. Stavy po léčbě zhoubných nádorů jsou rovněž považovány za kontraindikaci výkonu s výjimkou basaliomu kůže či jiných „low-grade“ maligních onemocnění. Minimální odstup transplantace od úspěšné léčby závažného maligního onemocnění se udává 5 let. Systémová infekce mimo kontrolu antibiotické terapie představuje rovněž absolutní kontraindikaci, infekce lokalizovaná na játra takovou kontraindikací není. ⁽³⁷⁾ Z technických kontraindikací



tvoří hlavní překážku poruchy portálního řečiště. Izolovaný uzávěr portální žíly při zachovaném toku mesenterální žilou lze vyřešit, kompletní trombóza všech větví portálního systému však dává chirurgovi jen malou naději na úspěch. ^[38]

Závažnou kontraindikací jsou psychiatrická onemocnění, která se mohou transplantací zhoršit. Patří sem schizoafektivní psychózy, těžké depresivní stavy a závislost na návykových látkách. Neschopnost či neochota ke spolupráci pro poruchy osobnosti či intelektu jsou další oblastí, kdy transplantace jater není indikována. Smutnou kapitolou je pak absence dostatečného sociálního zázemí, která zejména u dětí a starších nemocných může představovat kontraindikaci výkonu. ^[8, 39, 40]

